

## Carisol

(Tablets)



### CATEGORY:

Central muscle relaxant.

### COMPOSITION:

Each tablet contains: Carisoprodol 350 mg.

### PROPERTIES:

Carisoprodol produces muscle relaxation it behaves in an unknown way and its activity goes to its potential sedative effects.

The onset of action is rapid and effects last four to six hours.

### INDICATIONS:

Carisoprodol is indicated as an adjunct in short-term therapy for muscle tension.

### CONTRA INDICATIONS:

Acute intermittent porphyria as well as allergic or idiosyncratic reactions to carisoprodol or related compounds such as meprobamate, mebutamate or tybamate.

### SIDE EFFECTS:

Some side effects may appear: drowsiness, dizziness, vertigo, headache, insomnia, anxiety, trembling, nausea, vomiting.

### DRUG INTERACTION:

Other CNS inhibitions and alcohol participation enhances the CNS inhibition.

### WARNINGS:

- The use of this drug in pregnancy and in nursing mothers should be with caution. Carisoprodol is present in breast milk of lactating mothers at concentrations 2–4 times that of maternal plasma.
- It is not recommended for use in patients under 12 years of age.
- During the use of this drug caution should be exercised with patients driving a motor vehicle or drinking alcohol.
- Carisoprodol is metabolized in the liver and excreted by the kidney to avoid its excess accumulation, caution should be exercised in administration to patients with compromised liver or kidney function.
- Long term treatment is unadvisable.

### DOSAGE & ADMINISTRATION:

**Adult people** – Normal dose: 350 mg 3 times daily.

**For old people** – 175 mg 3 times daily.

### PACKAGE:

Each box contains 20 tablets.

PK0096/01

TPP1301482	THIS IS A MEDICAMENT
	<ul style="list-style-type: none"><li>– A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.</li><li>– Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.</li><li>– The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.</li><li>– Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.</li><li>– Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.</li><li>– Keep medicaments out of reach of children.</li></ul> <p>(Council of Arab Health Ministers &amp; Arab Pharmacists Association)</p>

Ultra Medica Pharmaceutical Industries: Sydnaiya – Damascus – Syria  
Tel.: +963 11 5955339 – Fax: +963 11 5975174  
E-mail: ultramed@scs-net.org – www.ultra-medica.net



(أقراص)

## كاريزول

### الزمرة الدوائية:

الكاريزول من الأدوية المرخية العضلية المركزية.

### التركيب:

يحتوي كل قرص على كاريزوبرودول ٣٥٠ ملغ.

### خواص المستحضر:

للكاريزول آلية مرخية للعضلات المركزية، وإن آلية تأثيره لا تزال غير معروفة ولكن يمكن أن ترجع إلى تأثيراته المرخية.

إن بداية التأثير يكون سريعاً ويستمر تأثيره من ٤-٦ ساعات.

### الإستطباب:

يعتبر الكاريزوبرودول كعامل مساعد في المعالجة قصيرة الأمد للتشنج العضلي المولم.

### مضادات الإستطباب:

لا يستعمل هذا الدواء بحال وجود إصابة حادة بداء برفيره وكذلك بحالات التحسس وحالات التحسس الذاتي للكاريزوبرودول أو للمركبات مثل (مبيروامات، مبيوتامات، تيبامات).

### التأثيرات الجانبية:

إن التأثيرات الجانبية التي يمكن أن تحدث نعاس، دوام، دوخة، صداع، أرق، قلق، رجفان، غثيان، إقياء.

### التداخلات الدوائية:

إن التأثير المثبط للجملة العصبية المركزية لهذا المستحضر يتعزز بالمشاركة مع الكحول أو مع مثبطات الجملة العصبية المركزية الأخرى.

### التحذيرات:

- يجب أخذه بحذر لدى الحوامل والمرضعات وقد ظهر الكاريزوبرودول في حليب الأم بتركيز أعلى من تركيزه في البلاسما الأم بـ ٢-٤ مرات.
- لا يعطى للأطفال دون ١٢ سنة.
- لا ينصح بقيادة السيارة أو تناول المشروبات الكحولية أثناء استخدامه.
- إن الكاريزوبرودول يستقلب في الكبد وي طرح عن طريق الكلية ولتجنب تراكمه يجب أخذ الحذر عند تناوله لدى الأشخاص الذين لديهم إصابات كبدية وكلوية.
- لا ينصح بأخذ هذا المستحضر لفترات طويلة.

### الجرعة الدوائية:

إن الجرعة العادية هي ٣٥٠ ملغ ٣ مرات يومياً.

نصف هذه الجرعة تعطى للأشخاص المسنين.

### العبوة:

عبوة تحتوي على ٢٠ قرص.

PK0096/01

TPP1301482	إن هذا دواء
	<ul style="list-style-type: none"><li>– الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.</li><li>– اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.</li><li>– إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء ونفعه وضرره.</li><li>– لا تقطع مدة العلاج المحدد من تلقاء نفسك.</li><li>– لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.</li><li>– احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.</li></ul> <p>(تعليمات مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدانين العرب)</p>

الترايديكا للصناعات الدوائية: صيدنايا – دمشق – سورية  
هاتف: +963 11 5955339 – فاكس: +963 11 5975174  
www.ultra-medica.net – ultramed@scs-net.org  
بريد الكتروني: