

Rexblad 5, 10, 15 SR

(Coated Tablets)

Rexblad

(Syrup)



COMPOSITION:

Each tablet of **Rexblad 5 SR** Contains: Oxybutynin Chloride 5mg.
Each tablet of **Rexblad 10 SR** Contains: Oxybutynin Chloride 10mg.
Each tablet of **Rexblad 15 SR** Contains: Oxybutynin Chloride 15mg.
Each 5 ml of **Rexblad syrup** Contains: Oxybutynin Chloride 5mg.

MECHANISM OF ACTION:

Oxybutynin Chloride exerts a direct antispasmodic effect on smooth muscle and inhibits the muscarinic action of acetylcholine on smooth muscle.

Oxybutynin Chloride relaxes bladder smooth muscle in patients with conditions characterized by involuntary bladder contractions.

Rexblad SR assures by its long acting release a suitable activity, so this composition assure comfortable to patients.

INDICATIONS:

Over active bladder with symptoms of urge urinary incontinence, urinary frequency, nocturnal enuresis in children above 5 years old.

CONTRA INDICATIONS:

- Urinary retention, gastric retention.
- Uncontrolled narrow angle glaucoma.
- Hypersensitivity to this medication or its components.

SIDE EFFECTS:

Dry mouth, constipation, sleepiness, headache, nausea, tachycardia, blurred-vision, dry eyes, rash, dizziness.

PHARMACOLOGICAL INTERACTION:

Increased drowsiness with alcohol and other CNS depressants medications.

Additive anti cholinergic effects with other anti cholinergic.

WARNINGS:

GI obstruction, gastro-esophageal reflux, hepatic or renal impairment, ulcerative-colitis, intestinal atony, myasthenia gravis, GI narrowing or stricture.

PREGNANCY & LACTATION:

It is advised not to use this medication during pregnancy or lactation without doctor council.

DOSAGE:

As doctor prescribe. it is not advised under 5 years old.

Pediatric patient 5 years and above the recommended starting dose is 2.5 mg 2-3 times daily up to 5 mg twice a day and the maximum dose is 5 mg three times a day.

Persons over 12 years adult: it is advised to start with 5 mg three times a day, may increase to 5 mg four times a day. increments with maximum dosage of 30 mg/day.

Swallow the tablet with fluid, do not chew or divide.

STORAGE:

Store in a dry place between 15-25°C.

PRESENTATIONS:

Rexblad 5 SR: Carton box of 20 Coated tablets, blister packed.

Rexblad 10 SR: Carton box of 20 Coated tablets, blister packed.

Rexblad 15 SR: Carton box of 20 Coated tablets, blister packed.

Rexblad syrup: Carton box of 125 ml glass bottle.

PK0194

Issue: Oct. 17/10

THIS IS A MEDICAMENT

- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep medicaments out of reach of children.

(Council of Arab Health Ministers & Arab Pharmacists Association)

Ultra Medica Pharmaceutical Industries: Sydnaya – Damascus – Syria

Tel.: +963 11 5955339 – Fax: +963 11 5953329

E-mail: ultramed@scs-net.org – www.ultra-medica.net



(مضغوطات ملمسة)

ريكسبلاد ٥، ١٠، ١٥ مدید

(شراب)

التركيب:

كل مضغوطه ريكسبلايد ٥ مدید تحتوي على: أوكسي بوتينين كلورايد ٥ ملغم.

كل مضغوطه ريكسبلايد ١٠ مدید تحتوي على: أوكسي بوتينين كلورايد ١٠ ملغم.

كل مضغوطه ريكسبلايد ١٥ مدید تحتوي على: أوكسي بوتينين كلورايد ١٥ ملغم.

كل ٥ مل ريكسبلايد شراب تحتوي على: أوكسي بوتينين كلورايد ٥ ملغم.

آلية التأثير والتأثيرات الدوائية:

يمثل هذا المستحضر تأثيراً مصادراً للتنفس مباثراً على العضلات الملساء و ينشط الفعل المسكاريكي للأستيل كولين على العضلات الملساء. كما أنه يرخي العضلات الملساء للملائنة عند المصايبن بقلصات مثانية غير إرادية. ويتميز ريكسبلايد مضغوطات مدید التأثير بأنه وعن طريق تحره طويلاً الأمد يحقق فعالية مناسبة وبالتالي فإن تركيبة هذا المستحضر تضمن التأثير المناسب والمريح للمربيض.

الاستطبابيات:
يستخدم في حالة فرط حرارة المثانة مع وجود أعراض سلس البول الإلحاقي، حالات زيادة توافر عدد مرات التبول، سلس البول الليلي عند الأطفال فوق ٥ سنوات من العمر.

مضادات الاستطبابيات:
في الحالات المرضية التالية:-
- الاحتقان البولي أو الاحتباس الهضمي المعدي.
- زرق تضيق الزاوية غير المعالج.
- فرط التحسس لهذا الدواء أو أحد مكوناته.

التآثيرات الجانبية:
قد تحدث عند بعض المرضى جفاف في الفم، إمساك، تهاب، صداع، غثيان، تسرع في القلب، رؤية مشوشة، جفاف عيني، دوخة، طفح جلدي.

التدخالات الدوائية:
زيادة النعاس مع الكحول أو بعض الأدوية العصبية الأخرى المشبعة للجملة العصبية المركزية، زيادة التآثيرات المضادة للكلورين مع أدوية أخرى مضادة للكلورين.

الاحتياطيات:
يستخدم بحذر في الحالات التالية:
الإسداد المعي، المنعكس المعدي المريض، القصور الكلوي أو الكبدي الشديد، التهاب القولون التقرحي، الخنزير المعمى، الوهن العصلي الไวدي، تضيقات الطرق الهضمية.

الحمل والأرضاع:
لا ينصح باستعمال هذا الدواء أثناء الحمل والإرضاع إلا باستشارة الطبيب.

الجرعة:
حسب رأي الطبيب المعالج والحالة المرضية، لا ينصح باستعمال الدواء تحت سن ٥ سنوات.

الأطفال فوق ٥ سنوات: يبدأ بجرعة ٢,٥ ملغم مرتبطة إلى ثلاثة يومياً على أن تزداد الجرعة حسب الحاجة حتى ٥ ملغم مرتبة في اليوم وتتغير الجرعة اليومية العظمى ٥ ملغم ثلاث مرات يومياً.

الأشخاص فوق ١٢ سنة والبالغين:
البدء بجرعة ٥ ملغم ٣ مرات يومياً على أن تزداد الجرعة إلى ٥ ملغم ٤ مرات باليوم للجرعة القصوى وهي ٣٠ ملغم في اليوم، مع ضرورة بلع المضغوط مع الماء دون مضغها أو سحقها.

الحفظ: يحفظ في مكان جاف بدرجة حرارة ١٥-٢٥°C.

العبوة:

ريكسبلاد ٥ مدید: علبة كرتونية تحتوي ٢٠ مضغوطات ملمسة بالفيلم ضمن بسترة.

ريكسبلاد ١٠ مدید: علبة كرتونية تحتوي ٢٠ مضغوطات ملمسة بالفيلم ضمن بسترة.

ريكسبلاد ١٥ مدید: علبة كرتونية تحتوي ٢٠ مضغوطات ملمسة بالفيلم ضمن بسترة.

ريكسبلاد شراب: علبة كرتونية تحتوي عبوة زجاجية سعة ١٢٥ ململ.

PK0194

Issue: Oct. 17/10

أن هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتليميات يعرضك للخطر.
 - اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتليميات الصيدلاني الذي صرفها لك.
 - إن الطبيب والصيدلاني هما الخبريان بالدواء ونفعه وضرره.
 - لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك.
 - لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
 - احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.
- (تميمات مجلس وزراء الصحة العرب والاتحاد العربي)

التراميديكا للصناعات الدوائية: صيدلانيا - دمشق - سوريا

هاتف: ٩٦٣ ١١ ٥٩٥٣٣٩ - فاكس: ٩٦٣ ١١ ٥٩٥٣٢٩

بريد الكتروني: www.ultra-medica.net - ultramed@scs-net.org